



予防接種

1 予防接種ができる医療機関

子どもから大人まですべての予防接種を受けることができます。町外での接種を希望する場合は**接種前**に保健福祉センターでの手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください(072-731-3201)。

医療機関名	住所	電話番号
森川医院	今西206番地	072-734-0046
奥井医院	平通80番地の5	072-734-2219
にしうら内科外科クリニック	平通131番地の2	072-734-3294
能勢町国民健康保険診療所	倉垣635番地	072-737-0064

2 子どもの予防接種の推奨スケジュール

R6.3.1の情報をもとに作成

ワクチン	乳児期				幼児期				学童期			推奨する接種年齢・期間 法律上は7ページに示す年齢・期間であれば接種可能ですが、病気にかかりやすい時期を考慮し下記の標準的な接種年齢・期間が定められています。					
	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	9 か 月	12 か 月	18 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳		6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳 以上
ロタウイルス 感染症	①②																①は、生後2か月～出生14週6日後までに済ませる。 ロタリックスは出生24週0日後までに計2回、ロタテックは32週0日後までに計3回接種する。①②③はそれぞれ27日以上の間隔をおく。
小児用 肺炎球菌	①②③				④												① 生後2か月～生後7か月未満 ①②③はそれぞれ27日以上の間隔をおく。 ④ 1歳～1歳3か月未満で、③から60日以上の間隔をおく。
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	①②③				④												① 生後2か月～生後7か月未満 ①②③はそれぞれ27日～56日までの間隔をおく。 ④は、③から7月～13月までの間隔をおく。
四種混合	①②③				④												①②③ 生後2か月～1歳未満で、それぞれ20日～56日までの間隔をおく。④は、③から12月～18月までの間隔をおく。
B型肝炎	①②			③													①②③生後2か月～生後9か月未満 ②は、①から27日以上の間隔をおく。 ③は、①から139日以上の間隔をおく。
BCG			①														① 生後5か月～生後8か月未満
麻疹風疹 (MR)					①					②							① 1歳以上2歳未満 ② 6歳となる(幼稚園・保育所の年長に相当する)学年(4月1日～翌3月31日)
水痘					①②												① 1歳～1歳3か月未満 ② ①から6月～12月までの間隔をおく。
日本脳炎								①②③						④			①② 3歳 ②は、①から6日～28日までの間隔をおく。 ③ 4歳で、②からおおむね1年を経過した時期 ④ 9歳
二種混合															①		① 11歳
子宮頸がん 予防ワクチン (HPVワクチン)															① ② ③		女性かつ13歳(7年生/中学1年生)となる学年(4月1日～翌3月31日) ◇2価ワクチン(サーバリックス):②は①から1月、③は①から6月の間隔をおく。 ◇4価ワクチン(ガーダシル):②は①から2月、③は①から6月の間隔をおく。 ◇9価ワクチン(シルガード): ①を15歳までに受ける場合は計2回。②は①から6月の間隔をおく。 ①を15歳になってから受ける場合は計3回。②は①から2月、③は①から6月の間隔をおく。

※今後、五種混合ワクチン(四種混合ワクチンとヒブワクチンのいずれの成分も含むワクチン)が新しく導入される予定です。接種の詳細は国において検討中のため、最新情報は町HPをご確認ください。