



予防接種

1 予防接種ができる医療機関

医療機関	住所	電話番号
ア 奥井医院 ※未就学児の定期接種は取扱いなし	平通80番地の5	072-734-2219
イ にしうら内科外科クリニック	平通131番地の2	072-734-3294
ウ 森川医院	今西206番地	072-734-0046
エ 能勢町国民健康保険診療所	倉垣635番地	072-737-0064

特別な事情により町外での接種を希望される方は、**接種前に**保健福祉センターでの手続きが必要な場合がありますので、お問い合わせください(072-731-3201)。

2 こどもの定期予防接種の推奨スケジュール

接種の際は、**母子健康手帳**と**予診票**が必要です。予診票を紛失された方は、再発行しますので**母子健康手帳を持って**保健福祉センターへお越しください。
同じ種類の予防接種はなるべく同じ医療機関で受けましょう。(時期や接種間隔の確認がスムーズです)

①②③④ 推奨するタイミング(数字は〇回目を表す) 法律上、接種することができる期間(詳細は次頁)

ワクチン	乳児期				幼児期				学童期				推奨する接種年齢・期間 法律上は7ページに示す年齢・期間であれば接種可能ですが、 病気にかかりやすい時期を考慮し下記の標準的な接種年齢・期間が定められています。			
	2 か月	3 か月	4 か月	5 - 8 か月	9 - 11 か月	12 - 15 か月	18 - 23 か月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳		7 - 8 歳	9 歳	10 歳 以上
ロタウイルス 感染症	①②			ロタリックス(1価)の場合												①は、生後2か月～出生14週6日後までに済ませる。 ロタリックスは出生24週0日後までに計2回、ロタテックは32週0日後までに計3回接種する。①②(③)はそれぞれ27日以上の間隔をおく。
	①②③			ロタテック(5価)の場合												① 生後2か月～生後7か月未満 ①②③はそれぞれ27日以上の間隔をおく。 ④ 1歳～1歳3か月未満で、③から60日以上の間隔をおく。
小児用 肺炎球菌	①②③			④												① 生後2か月～生後7か月未満 ①②③はそれぞれ20日～56日までの間隔をおく。 ④は、③から6月～18月までの間隔をおく。
五種混合	①②③			④												①②③生後2か月～生後9か月未満 ②は、①から27日以上の間隔をおく。 ③は、①から139日以上の間隔をおく。
B型肝炎	①②③															①②③生後2か月～生後9か月未満 ②は、①から27日以上の間隔をおく。 ③は、①から139日以上の間隔をおく。
BCG			①													① 生後5か月～生後8か月未満
麻しん風しん (MR)					①					②						① 1歳以上2歳未満 ② 6歳となる(幼稚園・保育所の年長に相当する)学年(4月1日～翌3月31日)
水痘					①②											① 1歳～1歳3か月未満 ② ①から6月～12月までの間隔をおく。
日本脳炎								①②③						④		①② 3歳 ②は、①から6日～28日までの間隔をおく。 ③ 4歳で、②からおおむね1年を経過した時期 ④ 9歳
二種混合														①		① 11歳
子宮頸がん (HPV)														①②③		女性かつ13歳(7年生/中学1年生)となる学年(4月1日～翌3月31日) ①を15歳までに受ける場合は計2回。②は①から6月の間隔をおく。 ①を15歳になってから受ける場合は計3回。②は①から2月、③は①から6月の間隔をおく。

3 乳幼児期・学童期の定期予防接種(予防接種法に定められている接種年齢・期間)(A類疾病)・間隔

法律上、定期予防接種として接種できる期間等は下記のとおりです。

注射生ワクチンを打った後に注射生ワクチンを打つときは、27日以上の間隔をおく必要があります。その他のワクチン(経口生ワクチン、不活化ワクチン)は接種間隔に規定がありません。(下記のほか、おたふくかぜワクチン(任意接種)も注射生ワクチンとなります。)

種別	法定対象年齢	回数・間隔	
ロタウイルス感染症 経口生ワクチン	1価 (ロタリックス) 5価 (ロタテック)	生後6週0日～24週0日後まで 生後6週0日～32週0日後まで	2回(27日以上の間隔をおく。) 3回(27日以上の間隔をおく。)
小児用肺炎球菌 不活化ワクチン	生後2か月～5歳未満	初回接種が生後2か月～7か月未満の場合 初回:2歳までに3回(27日以上の間隔をおく。) 追加:1回(初回終了後60日以上かつ1歳以降に1回) ※初回2回目の接種が1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わない。 初回3回目の接種が2歳を超える場合は接種しない。(ともに追加接種は可能) 初回接種が生後7か月に至った日の翌日～1歳未満の場合 初回:1歳までに2回(27日以上の間隔をおく。) 追加:1回(初回終了後60日以上かつ1歳以降に1回) ※初回2回目の接種は、2歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可能) 初回接種が1歳に至った日の翌日～2歳未満の場合 2回(60日以上の間隔をおく。) 初回接種が2歳に至った日の翌日～5歳未満の場合 1回	計2回 どちらか 計3回 初回接種開始時期により異なる
五種混合 ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ・ヒブ 不活化ワクチン	第1期初回 第1期追加	生後2か月～7歳6か月未満	3回(20日以上の間隔をおく。) 1回(初回終了後、6月以上間隔をおく。)
B型肝炎 不活化ワクチン	1歳未満	2回(27日以上の間隔をおく。) 1回(1回目の接種から139日以上の間隔をおく。)	計4回 計3回
BCG 注射生ワクチン	1歳未満	1回	計1回
麻しん 風しん(MR) 注射生ワクチン	第1期 第2期	1歳～2歳未満 幼稚園・保育所の年長相当の学年	1回 1回
水痘 注射生ワクチン	初回 追加	生後1歳～3歳未満	1回 1回(初回終了後3月以上の間隔をおく。)
日本脳炎 不活化ワクチン	第1期初回 第1期追加 第2期	生後6か月～7歳6か月未満 9歳～13歳未満	2回(6日以上の間隔をおく。) 1回(初回終了後6月以上の間隔をおく。) 1回
二種混合 ジフテリア・破傷風 不活化ワクチン	四種混合の第2期	11歳～13歳未満	1回
HPV (子宮頸がん) 不活化ワクチン	小学6年生～高校1年生相当の学年の女性 (4月1日～翌3月31日)	1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合: 2回(5月以上の間隔をおく。) 1回目の接種を15歳になってから受ける場合: 3回(1月の間隔をおいて2回、2回目の接種から3月の間隔をおいて1回)	計1回 初回接種年齢により異なる

4 日本脳炎の特例措置について(A類疾病)

平成18年度生まれのうち、20歳未満の方は、全4回のうち不足分を定期接種(無料)として接種可能です。予診票は、出生時又は転入時にお渡ししているものをそのままお使いいただけます。

NEW

5 妊婦の予防接種[RSワクチン](A類疾病)

妊娠中にワクチンを接種することで、お母さんに抗体を作り、RSウイルスが原因となる、重症な呼吸器感染症から赤ちゃんを守るための予防接種です。RSウイルス感染症は、乳幼児の多くが感染する疾患ですが、新生児期は重症化リスクが高いため、期間内に接種しましょう。

対象者	妊娠28週0日から36週6日の間に1回(不活化ワクチン)
費用	無料
受け方	予診票が届いたら(妊娠5か月頃に送付)、医療機関を予約して予防接種を受けてください。ただし、 接種医療機関が、能勢町、豊中市、池田市、吹田市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町以外の場合は、接種前に依頼状の申請が必要 です。